

- فشار خون بالا
- مردان مسن یا زنانی که وارد دوران یائسگی شدند
- سوء مصرف کوکائین یا آمفتامین

نشانه های فردی که دچار حمله قلبی شده اند

است چه می باشد؟

- احساس سنگینی و فشار غیرطبیعی بر روی قفسه سینه، گوینی که وزنه سنگینی بر روی قفسه سینه قرار دارد
- بسیاری از افرادی که دچار حمله قلبی می شوند از احساس فشار و سنگینی بر روی وسط سینه خود و یا سمت چپ قفسه سینه رنج می برند. این حس ناخوشایند معمولاً بیشتر از چند دقیقه طول می کشد و ممکن است رفع شود و دوباره برگردد. حتی ممکن است احساسی مانند سوزش سردرد یا سوء هاضمه به فرد دست دهد.
- احساس درد شدید در قسمت پشت، گردن و فک صورت این علایم می تواند شامل درد و ناراحتی در یک یا دو بازو، پشت، شانه ها، گردن، فک و قسمت بالای معده باشد. در در ناحیه پشت و گردن و فک از علایم شایع حملات قلبی در خانم ها می باشد.
- تنگی نفس شدید
- این علامت می تواند به شکل ناگهانی رخ دهد، در حالی که شما در حال استراحت هستید و یا فعالیت بدنی کمی دارید. فرد ممکن است برای نفس کشیدن تلاش کند و به سختی بیفتد .
- تنگی نفس می تواند قبل و یا همزمان با درد قفسه سینه رخ دهد و یا حتی می تواند تنها علامت حمله قلبی باشد.
- عرق سرد

سکته قلبی یا انفارکتوس میوکارد (MI) همچنین تحت عنوان حمله قلبی نیز نامیده میشود. حمله قلبی زمانی اتفاق می افتد که یک شریان شاخص و مهم بطور کامل مسدود شود و یک اورژانس پزشکی محسوب میگردد. اگر شما یا هر شخص دیگر دارای نشانه های زیر باشید، مراقبتها فوری پزشکی مورد پیگیری قرار می گیرد.

علائم و نشانه ها

- ✓ درد ، سنگینی، فشار، سوزش در سینه ، پشت ، بازوی چپ، فک، گردن
- ✓ دشواری تنفس
- ✓ گیجی، ضعف و بیحالی
- ✓ تهوع ، استفراغ
- ✓ ضربان قلب نامنظم

علت انفارکتوس میوکارد

آترواسکلروزیس ، فرایند انسدادی پلاک در داخل یک شریان تا بسته شدن آن، شایعترین عامل حمله قلبی است. حمله قلبی همچنین می تواند ناشی از اسپاسم عضله قلب و یا مشکلات ارثی قلب باشد. شرح ذیل با افزایش خطر حمله قلبی همراه است.

- کشیدن سیگار
- رژیم پر چربی، وزن بدن بالا
- تاریخچه خانوادگی سکته قلبی اخیر دیابت
- داروهای ضد بارداری خوراکی



سکته قلبی (MI)



تھیہ و تدوین

جواد سبحانی (کارشناس پرستاری)
مهین رمضانی اول (کارشناس پرستاری)

وقریب بود کیفیت و اعتبار، بخشی سپارستان ۲۲ بهمن گتاباد

- بیشتر زنانی که دچار حمله قلبی می شوند، نیاز به CPR ندارند، اما اگر فردی آگاهی اش را از دست بدده و نبض نداشته باشد و نفس هم نکشد، با انجام احیای قلبی ، تا قبل از آن که نیروهای اورژانس برستند، می توان جان او را نجات داد

تذکر

- باید این نکته را به خاطر داشته باشید افرادی که با نحوه انجام احیای قلبی ریوی آشنا هستند، می توانند بیماران دچار حمله قلبی را نجات دهند و کسی که با این روش آشنا نیست، قادر به انجام آن نخواهد بود.



موفق باشید

اقدامات اولیه کمک به فردی که دچار حمله قلبی شده :

- اگر می توانید سریعاً اورژانس را خبر کنید تا قبل از از دست دادن زمان، به وضعیت فرد رسیدگی شود.
- راه هوایی، وضعیت تنفس و گرددش خون فردی که دچار حمله قلبی شده را چک کنید. اگر بیمار بیهوش شده، احیای قلبی ریوی (CPR) انجام دهید.
- خونسردی خود را حفظ کنید. اگر مریض به هوش است، با او صحبت کنید و به او بگویید که نیروهای اورژانس در راه هستند و به زودی خواهند آمد.
- اگر کپسول اکسیژن در دسترس است، از اکسیژن برای تنفس بهتر بیمار استفاده کنید. این کار سبب می شود که بیماری که دچار حمله قلبی شده کمتر انرژی مصرف کند تا نفس بکشد.
- تا زمانی که نیروهای امدادی از راه برستند، به ارزیابی وضعیت و علایم حیاتی بیمار ادامه دهید. اگر تنفس او قطع شد به او کمک کنید و در صورت لزوم احیای قلبی ریوی انجام دهید.

احیاء قلبی ریوی یا CPR

- احیای قلبی ریوی کمک می کند تا جریان خون و اکسیژن حفظ شود و تا درمان قطعی بیمار ، ممکن است ادامه پیدا کند .

- عرق بیش از حد که به عرق سرد مشهور است، از علایم حمله قلبی می باشد. البته در خانم های یائسه باید این علامت را بیشتر بررسی کرد ، زیرا آنها در یائسگی دچار گرگرفتگی می شوند. یکی از علایم حمله قلبی در خانم ها، خستگی ناگهانی و شدید و یا احساس کمبود انرژی در فرد می باشد که افراد به راحتی از آن چشم پوشی می کنند.
- خستگی غیرعادی و شدید

- یکی از علایم حمله قلبی در خانم ها، خستگی ناگهانی و شدید و یا احساس کمبود انرژی در فرد می باشد که افراد به راحتی از آن چشم پوشی می کنند. این علامت می تواند به طور ناگهانی و یا به مدت چند روز وجود داشته باشد. بسیاری از خانم ها در اثر سابقه حمله قلبی ، تجربه خستگی و ضعف عضلانی را دارند که مربوط به فعالیت و ورزش کردن نمی باشد.

- احساس گیجی و یا سردرد
- برخلاف بسیاری از فیلم ها، حمله قلبی سبب بیهوشی فرد نمی شود ، بلکه احساس گیجی و منگی به فرد دست می دهد.

- تهوع و استفراغ (احساس بیمارشدن معده)
- خانم ها دو برابر آقایان تجربه تهوع و استفراغ و یا سوء هاضمه را در طی حمله قلبی خود دارند. این علایم گاهی جدی گرفته نمی شود و با بیماری های دیگر اشتباہ گرفته می شود.

- اگر هریک از علایم ذکر شده در بالا را در فردی مشاهده کردید که بیش از ۵ دقیقه طول کشید ، با اورژانس تماس پنگیرید. به یاد داشته باشید که تسريع کمک رسانی ، می تواند زندگی فرد مبتلا به حمله قلبی را نجات دهد.