

حیوان گزیدگی



تهیه کننده:

دنیا هاشمی

و این افراد هر سه سال باید یک نوبت واکسن به عنوان به عنوان یاد آوری تزریق کنند.
درمان:

کسی که توسط حیوان مشکوک به هاری گاز گرفته شود باید فوراً محل گاز گرفتگی را با آب و صابون به مدت حداقل ۲۵ دقیقه شستشوی بدهند و سریعاً به مرکز درمانی مقابله با هاری مراجعه کنند. تا با واکسیناسیون هاری درمان شود.

شستشوی زخم مربوط به گاز گرفتگی حیوان و بخیه نکردن و باز بودن زخم بسیار مهم است، سپس می توان از مواد ضد عفونی کننده مثل بتادین استفاده کرد. چون ویروس هاری به نور و جریان هوا حساس است و در نتیجه نباید زخم بخیه شود حتی الامکان روی زخم باز باشد به صورت رایج واکسیناسیون تا شش روز پس از گاز گرفتگی و قبل از بروز علائم هاری می توانند صد در صد بیماری را از بین ببرند اما پس از بروز علائم درمان دیگر امکان پذیر نیست و بیمار با وجود مراقبتهای کامل طی یک یا دو هفته جان خود را از دست خواهد داد

بگیرد در ادامه باید از ضد عفونی کننده هایی مانند الکل یا ید یا کلر هگزیدین استفاده کنید بعد هر چه سریع تر به نزدیک ترین درمانگاه یا بیمارستان بروید.

۲- کسانی که هیچ وقت واکسن های هاری نزده اند در صورت گاز گرفته شدن توسط سگ ها باید در ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت آینده این واکسن را تزریق کنند.

۳- زمانی که محل گاز گرفته خون ریزی فعال دارد از بستن محل زخم خودداری شود
پیشگیری از هاری:

۱- از سگ ها و گربه های واگیر دار فاصله بگیرد
۲- حیوانات اهلی خود را به موقع واکسینه کنید
۳- کسانی که با حیوانات در تماس هستند (دامپزشکان، شکارچیان، دامپروران، جنگلبانان و....) باید علیه بیماری هاری واکسینه شوند. برای پیشگیری در هاری در این افراد واکسن در چهار نوبت تزریق می گردد. که در نوبت دو، سه، چهار به ترتیب هفت روز بیست و هشت روز و یک سال بعد از نوبت اول تزریق می گردد

تعریف:

هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است این بیماری کشنده بین حیوانات (پستانداران خون گرم) و انسان مشترک بوده و اغلب به وسیله گزش حیوان آلوده مانند سگ، گربه، خفاش، گاو و ... به انسان منتقل می شود. در صورت بروز علائم هاری این بیماری درمان ناپذیر بوده و سرانجام باعث مرگ می شود. البته افرادی که توسط حیوانات اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند اگر در اسرع وقت به مراکز پیشگیری مراجعه کنند به این بیماری مبتلا نمی شوند.

راه های سرایت بیماری

- ۱- اصلی ترین راه سرایت بیماری گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. که در مورد گربه و گربه سانان از طریق کشیدن پنجه آغشته به بزاق نیز انتقال بیماری صورت می گیرد.
- ۲- پوست: بیماری هاری از راه پوست سالم قابل سرایت نیست و اگر کوچک

خراش یا زخمی در پوست وجود داشته باشد. در تماس با ترشحات آلوده انتقال صورت خواهد گرفت.

۳- سایر راه ها: انتقال بیماری به ندرت از طریق دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، پیوند اعضا، جفت، وسایل آلوده، مخاطت ها و از انسان به انسان امکان پذیر است.

علائم بیماری هاری در حیوانات:

زمانی که ویروس به بدن وارد می شود از طریق اعصاب به مغز وارد منتقل می شود.

علائم هاری در سگ ها، گربه ها و راسوها ممکن است متفاوت باشد که شامل ترس حالت تهاجمی، ریزش بزاق از دهان، بلع سخت، گیج بودن، تلو تلو خوردن و تشنج و غیره در حیوانات وحشی مبتلا ممکن است تنها شامل اختلالات رفتاری باشد علاوه بر این علائم هاری در سگ و گربه، اسب و گاو، گوسفند و بز ممکن است گوشه گیر شوند و به خود آسیب برسانند و یا به

نور حساس شوند.

علائم بیماری هاری در انسان:

علائم اولیه: ۱- سرفه ۲- تب ۳- سردرد ۴- بدن درد ۵- سوزش در محل گاز گرفتگی ۶- کاهش اشتها ۷- احساس تهوع ۸- درد عضلانی ۹- گلو درد

علائم نهایی هاری: اضطراب،

رفتارهای خشونت آمیز، توهم و افسردگی، ترس از آب، مشکل در جهت گردن و تکلم ناتوانی در بلع، فلج شدن فک، حرکت غیر طبیعی عضله، دیافراگم، دو بینی، ایست قلبی، مشکلات تنفسی در بیمار

اقدام اولیه او در هنگام حیوان گزیدگی

۱- زخم باید با کمک آب و صابون و یا مواد شوینده دیگر کاملاً پاکسازی شود و حداقل ۵ دقیقه در معرض تماس با آب روان قرار