

به توصیه های زیر توجه نمایید :

- از هر گونه فعالیت که باعث درد قفسه سینه ، تنگی نفس یا خستگی بی مورد می شود اجتناب کنید.
- از تماس با گرما یا سرمای شدید و راه رفتن در مقابل باد سرد پرهیزید.
- از افزایش وزن جلو گیری نمایید و وزنان را در حد متعادل نگهدارید.
- مصرف سیگار را قطع کنید و از تماس با افراد سیگاری پرهیزید.
- کمی خستگی در دوران نقاوت طبیعی است . در بین فعالیت هایتان دوره هایی از استراحت داشته باشید.
- سعی کنید برنامه غذاخوردن را منظم باشد (خودداری از خوردن غذای زیاد و خوردن با عجله ، رعایت رژیم غذایی تجویز شده که عموماً این رژیم شامل غذاهای کم نمک و کم چربی است .)
- داروهایتان را طبق دستور پزشک مصرف نمایید .
- فشارخون و قند خون تان را در محدوده طبیعی حفظ کنید.
- فعالیت های تقویحی جهت کاهش فشار روانی داشته باشید.
- فعالیت جنسی را حداقل ۴ هفته به تعویق بیندازید و هر نوع سوال در این مورد را با پزشک در میان بگذارید .
- در زمان مقرر جهت ویزیت پزشک و برنامه پیگیری شامل آزمایشات دوره ای خون و نوار قلب مراجعه نمایید .

بعد از رهایی از عالیم بیماری یک برنامه توانبخشی قلبی (برنامه مراقبت مداوم) با هدف کاهش خطرات و ارتقای کیفیت زندگی لازم است . برنامه توانبخشی طولانی مدت شامل افزایش برنامه فعالیت و ورزش به شرح زیر است :


- سطح فعالیت و شدت فعالیت تان را به صورت تدریجی افزایش دهید .
- راه رفتن روزانه همراه با افزایش مدت و فاصله راه رفتن طبق دستور پزشک و یا شرکت در برنامه ورزشی روزانه که به شکل ۴



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانروود

بیمارستان گروهی خارجی



تئیه کننده: مستور حسینی

یک برنامه ورزش منظم تا آخر عمر ادامه دارد ، توصیه می شود .

- در طی فعالیت جسمی سرعت نیستن را تا رسیدن به حد اکثر سطح فعالیت کنترل کنید .
- از فعالیت هایی که باعث سفت شدن عضله می شوند ، ورزش ایزومتریک ، وزنه برداری و هر گونه فعالیتی که نیاز به صرف ناگهانی انرژی دارد ، اجتناب کنید .
- از انجام ورزش بالافصله بعد از غذا خودداری کنید .
- در ابتدای بازگشت به کار طول مدت کار را کوتاه نمایید .

● شناسایی و درمان مناسب عالیم زیر را یاد بگیرید :

- گزارش به ۱۱۵ در صورت بروز فشار یا درد قفسه سینه در صورتی که به وسیله سه عدد قرص نیترو گلیسرین به فاصله ۵ دقیقه از هم تسکین نیابد .
- تماس با پزشک در صورت بروز عالیم : تنفس کوتاه ، غش ، ضربان قلب کند یا تندر ، تورم پا و فوزک پا

- نوار قلب
- انجام اکوی قلبی
- انجام تست های آزمایشگاهی (آزمایشات خون)
- در صورت بروز **ACS** ، لازم است بیمار در بیمارستان بستری شود
- چرا که در این بیماری یکی یا بیشتر از شریان های کرونری قلب مسدود شده است .

❖ اقدامات درمانی ❖

- هدف از درمان به حداقل رساندن آسیب عضله قلب ، حفظ عملکرد آن و پیشگیری از عوارض است . به این منظور اقدامات زیر انجام می شود:
- توصیه به استراحت در بستر (حداقل ۱۲ تا ۲۴ ساعت) در حالتی که سر تخت بالا آورده شده است .
 - تجویز اکسیژن
 - تجویز داروهای آسپیرین
 - نیتروگلیسرین
 - داروهایی مانند کاپتوپریل (برای پایین آوردن فشار خون و کاهش نیاز قلب به اکسیژن)
 - مورفین (برای کاهش درد ، اضطراب و کار قلب)
 - داروهای ضد انعقاد مانند هپارین
 - داروهای حل کننده لخته (تروموبولیتیک ها)
 - اقدامات فوری برای برطرف کردن انسداد شریان های کرونری نظیر آنزیوپلاستی یا قرار دادن استنت برای باز نگه داشتن شریان جراحی

دستورالعمل مراقبت از خود در منزل

- اهداف فوری در مراقبت از خود بعد از ترجیح شامل موارد زیر است :
- محدود کردن اثرات و پیشرفت آترواسکلروز
- بازگشت به کار و فعالیت قبل از ناخوشی
- پیشگیری از بروز واقعه قلبی در دوران نقاوت و بهبودی




❖ علایم ❖

- مهم ترین علایم بیماری عبارتند از :
- درد ناگهانی قفسه سینه و تداوم درد علیرغم استراحت و دریافت دارو
 - تنفس کوتاه ، سریع و تنگی نفس
 - تهوع و استفراغ
 - پوست سرد و مرطوب و رنگ پریده
 - اضطراب ، بیقراری و گیجی
 - ضربان قلب سریع یا خیلی آهسته

❖ تشخیص ❖

- بیماری با استفاده از روش های زیر تشخیص داده می شود :
- گرفتن تاریخچه بیماری

قلب پر کارترین اندام بدن انسان است و در سراسر زندگی یک فرد به طور دائم خون غنی از اکسیژن و مواد غذایی را از طریق شبکه رگ ها (گردش خون) به تمام قسمت های بدن می رساند .



عضله قلب برای این که بتواند عمل خونرسانی به بدن را به طور مناسب انجام دهد خود نیز نیاز به خون غنی از اکسیژن دارد و این خون توسط شریان کرونری تامین می شود . در صورت بروز انسداد در شریان های کرونر ، خونرسانی به عضله قلب کاهش می یابد.

ACS یک موقعیت اورژانس است که در آن تامین خون و اکسیژن مورد نیاز عضله قلب به شدت کاهش می یابد . بیماری به صورت ناگهانی و حاد شروع می شود و در صورت عدم درمان سریع منجر به مرگ بافت عضله قلب می شود . **ACS** طیفی از بیماری ها به شرح زیر را شامل می شود :

- آنژین قلبی (حملات درد یا فشار بر قسمت قدامی قفسه سینه که معمولاً بر اثر کافی نبودن جریان خون عروق کرونری در نتیجه بیماری آترواسکلروزی قلب ایجاد می شود) که از قبل وجود داشته ولی در حال حاضر باید از طولانی مدت و بسیار شدیدتر از قبل شده و در زمان استراحت نیز وجود دارد .
- یک حمله قلبی به همراه آسیب و مرگ سلوی های عضله قلب (سکته قلبی حاد)