

یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش می‌کند، تا سرطان یا دیگر بیماری‌های احتمالی را تشخیص دهد.

## آموزش‌های بعد از عمل

▪ بعد از عمل از انجام کارهای سنگی و برداشتن اجسام سنگین خودداری کنید.

در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا 3 ماه به تأخیر اندازید تا رحم شما آمادگی مجدد را پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری انجام شود.

▪ ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

جلوگیری باستی بمحض خروج از بیمارستان آغاز شود.

▪ بعد از کورتاژ از غذه‌ای سرشار از آهن (مانند: گوشت قرمز، جگر، تخم مرغ، غلات، سبزی جات سبز، کشمش سبز) استفاده نموده و در صورت نیاز، برای جبران کم خونی خود قرصهای آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت 3 ماه استفاده نمایید.

در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه نمایید:

▪ 1- تب

▪ 2- ترشحات زیاد و غیر طبیعی

▪ 3- درد زیاد در قسمت زیر شکم

▪ 4- افزایش خونریزی

▪ 5- ترشحات بدبو

▪ 6- هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی، ضعف، بی حالی و غیره

توجه داشته باشید عمل کورتاژ هیچ تأثیری در روند زندگی شما ندارد و می‌توانید بعد از یک هفته استراحت، بدون هیچ مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.



## کورتاژ


تھیہ کننده: پرستو نوری  
بخش اطفال

## آموزش‌های حین عمل

عمل کورتاژ ضمن بیهوشی عمومی یا بیحسی ناحیه‌ای انجام می‌شود و برای دسترسی آسان به رحم شما را در وضعیت مناسبی قرار می‌دهند.



ابتدا دهانه‌ی رحم می‌کنند؛ در صورتیکه علت خونریزی سقط است، محصولات حاملگی را خارج می‌نمایند و اگر علت خونریزی نا معلوم است از بافت دهانه‌ی رحم و رحم نمونه (بیوپسی) بر می‌دارند.



اگر پزشک شد ممکن است آن را خارج کند و جهت پابلوتوزی بعرسند.

۵- خونریزی قاعده‌گی با فواصل منظم و حجم زیاد همراه با دفع لخته.

## آموزش‌های قبل از عمل

- ۱۰-۸ ساعت قبل از عمل چیزی نخورید، در صورت اورژانسی بودن عمل به محض اطلاع از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.

- در صورتی که عمل شما خیلی اورژانسی نیست، قبل از عمل برای کاهش آلدگی و احتمال عفونت، استحمام کنید و لازم است موهای ناحیه‌ی عمل، قبل از جراحی تراشیده شود.

- قبل از رفتن به اتاق عمل زیورآلات، اجسام فلزی، گیره‌ی سر، لنز، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.

- کلیه لباسها، حتی لباس زیر و جورابهای خود را درآورید و لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید.


- لای ناخنها و آرایش خود را پاک کنید.
- قبل از خروج از بخش جراحی، ادرار خود را تخلیه کنید.



باز کردن دهانه‌ی رحم و تخلیه‌ی نسج آن را کوتراژگویند. این عمل یکی از شایع‌ترین عملهای زنان است، می‌توان برای تشخیص یا درمان خونریزی‌های غیر طبیعی زنان به کار رود.

## خونریزی غیر طبیعی زنان چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیر طبیعی از واژن (مهبل) گردد. خونریزی غیر طبیعی به خونریزی گفته می‌شود که در زمان خارج از انتظار ما اتفاق بیافتد. و یا دارای مقداری بیش از حد انتظار باشد.



- ۱- بعد از تماس جنسی
- ۲- هنگام یائسگی یا بعد از آن
- ۳- در بین دو دوره‌ی قاعده‌گی به صورت لکه بینی
- ۴- ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه‌ی اول حاملگی.