



آمادگی های لازم قبل از عمل جراحی:

- انجام رادیوگرافی لازم جهت تشخیص آزمایش خون، ادرار، مدفعه، و هم چنین نوار قلب
- شیوه های زاید از زیر سینه تا نیمه ران و پهلوها
- رعایت رژیم غذایی کم نمک کم چرب از چند روز قبل از عمل
- در خواست رزرو خون

مراقبت های بعد از عمل جراحی:

- تجویز مسکن های کافی و به موقع تا بیمار بتواند به راحتی نفس های عمیق کشیده و از بروز عوارض ریوی جلو گیری کند
- تشویق به خروج از تخت و داشتن تحرک برای جلو گیری از لخته شدن خون
- ناشتا بودن تا زمانیکه پزشک دستور دهد
- کنترل جذب و دفع
- بیمار به حالت نشسته قرار گیرد تا تخلیه صfra

سنگ کیسه صfra در این افراد بیشتر دیده می شود: خانم های میانسال، مصرف قرص های ضد حاملگی و استرو ژن، چاقی، کاهش وزن سریع، دیابت یا سیروز، رژیم غذایی پر چرب و کم فیبر، سابقه خانوادگی بیماری کیسه صfra

راه های تشخیصی:

سونوگرافی و کلانژیوگرافی آندوسکوپیک پس رونده در تشخیص موثر هستند.

درمان:

کله سیستکتومی (برداشتن کیسه صfra) درمان انتخابی سنگ کیسه صfra و کله سیستیت حاد می باشد. کله سیستکتومی با لاپاروسکوپ امروزه بهتر از کله سیستکتومی با جراحی باز است. اقدامات حمایتی مانند احیاء مایعات و آنتی بیوتیک وسیع الطیف نیز به کار می رود. داروهای ضد درد، از جمله مخدراها، برای تخفیف درد تجویز شوند.

از درمانهای جدید سنگ کیسه صfra در موارد غیر حاد تزریق مواد حلal از طریق پوست به کیسه صfra و نیز

"التهاب کیسه صfra"

کله سیستیت یعنی التهاب کیسه صfra، این بیماری اغلب ناشی از سنگ کیسه صfra (کله لیتیاز) می باشد. علائم بیماری در موارد غیر حاد به صورت کولیک صفراوی گاه همراه با تھوھ و استفراغ است.

گاهی درد به دنبال مصرف غذای چرب می باشد. ممکن است بیماری سال ها علائم سنگ کیسه صfra را داشته باشد ولی وارد مرحله حاد نشود.


در کله سیستیت حاد ما درد شکمی شدید ، تب و لرز ، زردی و استفراغ را داریم. که اغلب به علت انسداد مجرای کیستیک توسط سنگ کیسه صfra است ولی گاهی نیز سایر علل مانند تومورها موجب انسداد مجرما می شوند.

البته کله سیستیت مزمن بدون سنگ به صورت حاد در بیماران شدیداً بدحال و به صورت مزمن نیز داریم.



کله سیستکتومی

گروه هدف بیمار و همراهان



منبع:

پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران
کتاب جراحی نلسون 2018

- شروع رژیم غذایی نرم پس از بازگشت صدایهای روده‌ای
- مراقبت از درن و لوله‌ها، زخم جراحی و پانسمان
- کنترل تب، تهوع و یرقان
- کنترل رنگ [ادرار](#) و مدفوع به صورت روزانه و آزمایش کردن آنها از نظر وجود مواد صفرایی
- دادن داروهای مسهل و یا تعییه رکتال تیوب و انجام تنقیه برای کاهش نفخ شکم

عوارض کله سیستکتومی باز:

آمبولی و عوارض ریوی