



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت

تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو

(CCHF)

مورد مظنون

شروع ناگهانی بیمار با تب + درد عضلات + تظاهرات خونریزی دهنده (شامل: راش پتشی، خونریزی از بینی و مخاط دهان، استفراغ خونی یا ملنا، هماتوری) + یکی از علائم اپیدمیولوژیک (سابقه گزش با کنه یا له کردن کنه با دست، تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافت های دام ها و حیوانات آلوده، تماس مستقیم با ترشحات دفعی بیمار قطعی یا محتمل CCHF، اقامت یا مسافرت در یک محیط روستایی که احتمال تماس با دام ها وجود داشته اما یک تماس خاص تصادفی را نمی توان مشخص نمود).

مورد محتمل

موارد مفلون + ترمبوسیتوپنی (کاهش پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰۰ در میلی متر مکعب) که می تواند با لکوپنی (گلبول سفید کمتر از ۳۰۰۰ در میلی متر مکعب) یا لکوسیتوز (گلبول سفید بیش از ۹۰۰۰ در میلی متر مکعب) همراه باشد.

توجه: طبق جدول معیارهای تشخیص بالینی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (دستورالعمل کشوری) چنانچه جمع امتیازات ۱۲ و یا بیشتر شود نیز به عنوان مورد محتمل تلقی شده و تحت درمان قرار می گیرد.



مورد قطعی

موارد محتمل + تست سرولوژیک مثبت یا جدا کردن ویروس

نمونه تریاژ بیمار محتمل

- ۱- هماهنگی با فوکال پوینت علمی برنامه جهت دستور به درمان یا رد تشخیص (در صورت نبود فوکال پوینت علمی مشاوره از متخصص عفونی)
- ۲- گزارش تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان
- ۳- بستری در اتاق ایزوله
- ۴- بلافاصله شروع درمان طبق دستورالعمل
- ۵- تهیه نمونه سرم خون و هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان جهت ارسال نمونه به انستیتو پاستور ایران به منظور تشخیص قطعی بیماری

