

+ نصف قرص) را تجویز کرده باید تمام این فرص را در ساعت مشخصی از روز مصرف کنید.

آیا من داتید تو اثر مصرف قرص شما چگونه است؟

توجه داشته باشید که قرص‌های وارفارین را فقط باید در روزهایی که پزشک برای شما تعیین کرده مصرف کنید مصرف بیش از حد نیاز وارثارین، چه عوارضی ایجاد می‌کند؟ اگر مقدار وارفارین، بیش از حد نیاز باشد ممکن است فرد را در معرض خطر خون‌ریزی و مشکلات جدی و تبدید کننده حیات قرار دهد عالم عبارتند از:

خون‌ریزی که به صورت خود به خود بند نیاید

خون‌ریزی از بینی که بیش از ۱۰ دقیقه طول بکشد و یا

خون‌ریزی‌های منظم از بینی

خون‌ریزی از لکه

انوار قرمز و یا قهوه‌ای تیره

منفوع تیره

خون‌ریزی‌های شدید طی دوره‌های قاعدگی در خاتمه توجه: ممکن است در اثر فرسایه ای شدید، خونی مشاهده نشود و نی درون بدن خون‌ریزی اتفاق افتاده باشد. پس بیمار باید مراقب فعالیت‌های خود باشد.

در صورت بروز خون‌ریزی و یا سرگیجه و فُعَّ و یا مثابده کبودی بدون دلیل و بدون هیچ ضریبه‌ای و یا قطع نشدن

خون‌ریزی و یا بروز هرگونه عارضه جدید باستی بپزشک اطلاع داده شود

نحوه نگهداری قرص‌های وارفارین چگونه است؟

قرص‌های وارفارین را در جای خنک و خنک نگهداری کنید

لزومی به نگهداری در یخچال نسی باشد و می‌توان آن را در دمای اتاق، دور از حرارت و گرما، رطوبت و نور مستقیم آشتاب نگهداری کرد. دارو باستی از بین‌زدگی محافظت شود.

وارثارین، یک داروی خد العقاد است که کار آن پیشگیری از لخته شدن خون است. گاهی به این دارو (دقیق کنند) خون افکته می‌شود و فرآیند لخته شدن خون را کند می‌کند: به عبارتی دیگر وارثارین کمک می‌کند که خون شمارا حت تر در بدن گردش کند و لخته نشود.

نحوه اندازه گیری وارفارین چگونه است؟

اندازه گیری وارفارین تسطیت خونی INR و PT انجام می‌شود. به عبارت دیگر بعد از اینکه پزشک، میزان مناسب وارفارین را با توجه به INR و PT فرد، برای وی تجویز کرد با شروع مصرف وارفارین، INR افراد تغییر می‌کند و زیاد می‌شود میزان INR ایند آل در اغلب بیمارانی که وارفارین مصرف می‌کنند در محدوده ۲-۳ است. یعنی پزشک با تجویز دوز خاصی از وارفارین سعی می‌کند INR بیمار را به این محدوده برساند.

آیا سیگار بر اثر بخشی وارفارین تاثیر دارد؟

عصرف سیگار به طور کلی باعث افزایش خطر تشکیل لخته می‌شود پس بهتر است عصرف سیگار قطع شود. بهترین زمان مصرف وارفارین چه ساعتی در روز است؟

در مورد مصرف وارفارین باید دقت شود که آن را هر روز در ساعت مشخص و ثابتی مصرف کنید. بهترین زمان مصرف عصرها می‌باشد مقدار مصرف دارو را خودسرانه کاهش یا افزایش ندهید و مقدار مصرفی خود را به دیگران توصیه نکنید. وارفارین را با معده خالی نیم ساعت قبل یا یک ساعت بعد از غذا مصرف کنید.

چند بار در روز وارفارین را مصرف می‌کنند؟


وارفارین را به صورت یک بار در روز مصرف می‌کنند. یعنی تمام مقدار مشخص شده برای مصرف در هر بار را یکباره مصرف کنید. به عنوان عثال اگر پزشک با توجه به INR شما، (۱ قرص

بیمارستان حضرت رسول شهرستان جوانرود

وارفارین و مراقبت‌های آن

سید غنیم
پسرآموخته بیمارستان

جهت بیماران



عادات غذایی و فعالیتی خود را حفظ نمایید. تغییرات ناگهانی می‌تواند بر INR اثر بگذارد.

در صورت بیمار شدن و یا بروز هر گونه عارضه جدید و یا خونریزی‌های شدید، به کلینیک وارفارین اطلاع دهید.

همیشه به میزان کافی وارفارین در منزل داشته باشید و یعنی از تمام شدن آن، دوباره تنسخه را از داروخانه تهیه نمایید.

اگر باردار شده‌اید و یا تضمیم به باردار شدن دارید، سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید. خودسرانه داروی خود را قطع نکنید.

ذر صورت انعام اعمال جراحی و یا دندانپزشکی، دندانپزشک و یا جراح خود را از مصرف وارفارین مطلع نمایید.

اگر قصد سفر دارید، حتماً مطمئن شوید که وارفارین به میزان کافی برای آن مدت به همراه دارید.

کارت هویت پزشکی، مبتنی بر مصرف داروی خد انتقاد، به همراه داشته باشید.

در صورت مراجعت به هر پزشک دیگری، حتماً پزشک را از مصرف وارفارین مطلع نمایید.

بدون مشورت با پزشک خود، مصرف همزمان سایر داروها با وارفارین را قطع و یا شروع نکنید. اگر همزمان با وارفارین، داروی دیگری مصرف می‌کنید، حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

در هنگام کار با ابزار تیز و برقی دقت بیشتری داشته باشید و از دستکش محافظ، استفاده کنید.

به جای استفاده از تیغ برای اصلاح، از ابزارهای برقی استفاده کنید.

از مساواک فرم استفاده کنید. از خلال دندان استفاده تکنید.

در منزل از جوراب و یا کفش‌های راحت استفاده کنید تا بدین وسیله پای خود را محافظت کنید (به عبارتی با پای برهنه در

خانه راه نروید) و در هنگام گرفتن ناخن مراقب باشید.

جوش، زگیل در روی بدن خود را دستکاری نکنید.

رزیم غذایی: باید مطمئن باشید که رزیم غذایی سالم و متعادلی دارید؛ بعضی غذاها مانند اسفناج و با کلم بروکلی حاوی ویتامین K هستند و در صورت مصرف زیاد می‌توانند با وارفارین تداخل ایجاد کنند. بنابراین مصرف این گونه غذاها باید در حد متعادل و کم باشد. البته نکته مهم این است که اگر به عنوان مثال مصرف

روزانه نصف کلم از عادات رزیم غذایی فرد است، باید هر روز همین مقدار کلم را مصرف کند و آن را قطع با کم و زیاد نکند.

این گفته که بیمار سعی کند غذاهای حاوی ویتامین K را مصرف نکند، غلط است: چون بسیاری غذاها حاوی ویتامین K هستند و طبق این گفته فرد از بسیاری از غذاها محروم می‌شود و این کار عملیاً غیر ممکن است. بنابراین بهترین کار این است که در رزیم غذایی خود تغییرات زیادی ایجاد نکنید.

خلاصه ای از بایدها و نبایدهایی که در صورت مصرف وارفارین، باید به آنها نوجه کرد:

در زمان‌های تعیین شده برای شما، جیوه مراجعت به کلینیک وارفارین، مراجعه نمایید و آزمایش خون را انجام دهید.

پزشک خود را از تمام داروهایی که مصرف می‌کنید، مطلع نمایید. همچنین پیش از شروع، تغییر و با قطع هر گونه دارو، مکمل و یا محصولات گیاهی با پزشک خود مشورت نمایید.

دارو باقیستی دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

قرص‌های از تاریخ مصرف گذشته را در منزل نگه داری نکنید. اگر نصف قرص را مصرف کردید، باقیمانده قرص را می‌توانید نگه دارید و در نوبت‌های بعدی مصرف کنید.

اگر یک نوبت از مصرف وارفارین را فراموش کردید چه اقداماتی باید انجام دهید؟ در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف

وارفارین، به محض به یاد آوردن، وارفارین فراموش شده را مصرف کنید؛ اما توجه شود اگر نزدیک مصرف نوبت بعدی وارفارین به یاد آوردید که فراموش کرده ابد وارفارین خود را به

صورت منظم ادامه دهید. هیچ گاه دو نوبت وارفارین را در یک نوبت مصرف نکنید.

آباً فردی که وارفارین مصرف می‌کند می‌تواند ورزش کند؟ انجام ورزش در افرادی که وارفارین مصرف می‌کنند به دلیل احتمال خونریزی شرایط ویژه دارد.

۱) از انعام ورزش‌های سنگین مانند فوتبال، وزنه برداری، هنرهای رزمی، کیک بوکسینگ، پرهیز شود.

۲) ورزش‌هایی که در آن‌ها برخوردي با سایر افراد وجود ندارد و سبک هستند مانع ندارند (مانند دویدن، پیاده روی، تنیس، بدمنیتون). البته باید دقت شود که در هنگام ورزش از بوشن‌های محافظتی مانند زانوبند، جوراب، کفش و کلاه اینمی استفاده شود. پس نیازی به محبوس کردن فعالیت‌های روزانه سبک نیست و بیمار باید سعی کند که تا آنجا که می‌تواند یک زندگی طبیعی داشته باشد و فقط باید از انجام فعالیت‌های سنگین خودداری کند.

با چه انداماتی می‌توان خطر خونریزی را کاهش داد؟ بیماری که وارفارین مصرف می‌کند باید بداند که احتمال

خونریزی در او بیشتر از یک فرد معمولی است.