

آمبولی ریه:

- از ریش تراش برقی و مسواک نرم جهت جلوگیری از خون ریزی استفاده کنید.
- از مصرف خودسرانه مسهله ها به دلیل تداخل با وارفارین و مصرف الكل (به علت افزایش اثر ضد انعقادی دارو) خودداری کنید.
- مقدار مصرفی غذاهای مانند گل کلم و کلم ثابت باشد زیرا در جذب وارفارین تاثیر دارند.
- ریواروکسابان: حل کننده لخته خون در آمبولی عروقی است. نیاز به آزمایش دوره ای برای کلیه ها دارد.

آموزش مراقبت از خود به بیماران:

- آموزش به بیماران جهت قرار دادن پا بالاتر از سطح قلب

علل آمبولی ریه:

- ۱- لخته خون ایجاد شده در ورید های عمقی در پا در اثر ایستادن و راه رفتن از جای خود کنده می شود.
- ۲- لخته کنده شده از سیاهه رگ ها، حرکت کرده و به قلب میرسد، از آنجا وارد ریه شده و باعث انسداد عروق ریه و قطع جریان خون میگردد.

علائم:

تنگی نفس ناگهانی، سرفه مداوم، درد قفسه سینه در زیر جناغ، تعریق شدید، خلط خونی، تب، تپش قلب، سنکوپ و مرگ ناگهانی

آموزش دارویی:

- ۱- درمان با ضد انعقاد و حل کننده لخته: دارو هایی مانند وارفارین سبب افزایش INR میشود و نیاز به چک PT,PTT,INR در فواصل منظم دارد.

- در صورت نیاز به اعمال جراحی دندانپزشکی و آندوسکوپی پزشک را از مصرف وارفارین آگاه کنید

انسداد سرخرگ ریه توسط لخته خون یا ذرات چربی که همراه خون از جای دیگر اورده شده و در رگ های کوچک ریه گیر میکند.

آمبولی ریه معمولا در اثر حرکت لخته خون از سیاهه رگ های پاها و بازو به سمت قلب است.

آمبولی ریوی عامل حدود ۵٪ از مرگ ها ناگهانی است..



عوامل خطر زا:


- ۱- از مهم ترین عوامل خطر زا شامل بی تحرکی، کاهش فعالیت بدنی، چاقی، بیماری های مزمن (مثل آنمی، بیماری قلبی و سرطان) شکستگی پا و لگن، جراحی لگن و پیری می باشد.

- ۲- سایر عوامل مربوط به تولید لخته بوده و شامل قرص های ضد بارداری، اختلالات انعقادی، واریس، حاملگی، زایمان، پوشیدن لباس های تنگ، سیگار و عفونت.

آمبولی ریه



-زمان مراجعه بعدی به پزشک جهت پیگیری را در
یاد داشته باشند
-مایعات کافی به صورت مایعات گرم به خصوص
هنگام مسافت دریافت کنند تا از غلظت خون
ناشی از کم آبی جلوگیری شود.



- استفاده از جوراب واریس برای جلوگیری از لخته
- انجام ورزش های پا به صورت فعال و غیر فعال و نیز داشتن تحرک از نشستن یا دراز کشیدن طولانی و انداختن پا روی پا و بالش در زیر پا و یا پوشیدن لباس های تنگ خودداری کند.
- چرخیدن مکرر در تخت
- در وضعیت نشسته نباید پا از لبه تخت آویزان باشد و باید کف پا روی زمین یا صندلی گذاشته شود.
- در صورت هرگونه درد و ناراحتی و قرمزی و التهاب و گرم شدن اندام ها به پزشک مراجعه کنید.
- هر گونه خونریزی و درد قفسه سینه را سریعاً اطلاع دهید
- به بیمار درباره اهمیت بهداشت و پیشگیری از چاقی تاکید کنید
- به بیماران زن توصیه شود برای پیشگیری از حاملگی از روش غیر هورمونی استفاده کند

منابع:

برونر و سودارت، قلب و عروق، ویراست چهاردهم

۲۰۱۸

ترجمه: دکتر سید مسلم مهدوی
راهنمای آموزش مدد جو برای مراقبت در
منزل، ۱۳۹۰، فاطمه علایی و همکاران