

## روشهای شیردهی

گرفته و لب پایین به عقب برگشته و چانه به شیرخوار به پستان مادر چسبیده است.

**روش سوم:** روش دیگر برای شیر دادن به نوزاد

روش زیر بغل یا بازو است که اهمیت استفاده از آن بخصوص در مادرانی است

که دارای دو قلو هستند و یا دچار انسداد مجاری شیر شده‌اند و یا نوزاد نمی‌تواند پستان مادر را در دست بگیرد یا مادر سزارین شده است استفاده می‌شود.

در این حالت مادر در وضعیت نشسته مثلاً با دست راست سر نوزاد را نگه می‌دارد و بدن و پای او را در زیر بازوی خود قرار می‌دهد در این روش هم می‌تواند از یک بالش در زیر دست استفاده نماید هنگامی که روش صحیح در آغوش گرفتن و شیر دادن پس از زایمان (یا حتی در دوران بارداری مدل عروسکی) آموزش داده شود.

پستان را در دهان بگیرد در چنین وضعیتی نوزاد ببا آرواره هایش به مخازن شیری فشار می‌آورد و با مکیدن درست به اندازه کافی شیر دریافت می‌نماید.

## روش دوم

اگر مادر سزارین یا زایمان طبیعی همراه با بخیه محل زایمان دارد و یا می‌خواهد استراحت کنند یا خسته است یا در شب یا گاهی برای پستان بزرگ توصیه می‌شود در این روش باید به وضعیت خوابیده مادر باید بجرخد و پتو و بالش را در جلوی شکم و پشت او قرار گیرد و گذاشتن بالش بین پاها خم کردن پاها به طرف شکم و کاهش فشار روی بخیه‌ها و کاهش درد کمک می‌کند در این وضعیت سر و بدن نوزاد در امتداد یک خط مستقیم است. روبروی پستان مادر قرار می‌گیرد پشت او نیز تکیه گاه دارد و مادر نوزاد را به طرف خود می‌آورد.

و بدن نوزاد را در تماس نزدیک با بدن مادر بوده و بهتر است پشت او با دست مادر حمایت شود و سر نوزاد روی خم آرنج قرار می‌گیرد و قسمت هاله در دهان شیرخوار قرار

**روش اول:** معمول ترین روش شیر دادن به قرار گرفتن و روش سنتی است که به طوری که

۱) سر نوزاد روی آرنج و بازوی مادر قرار گیرد

۲) صورت و مقابل پستان مادر و سر و بدنش در یک امتداد باشد ۳) دست نوزاد در تماس با بدن مادر است در پهلوی مادر قرار گیرد نه بین نوزاد و مادر

۴) نشیمنگاه او با دست مادر حمایت شود

۵) بهتر است لباس مادر و نوزاد کم باشد تا تماس با ما با بدن مادر و نوزاد هنگام شیر دادن مناسب تر باشد

مادر وضعیت راحت انتخاب کند و پس از در آغوش گرفتن نوزاد مادر می‌تواند با یک دست پستان را از گرفته طوری که انگشت شست در بالا و چهار انگشت در زیر پستان قرار گیرد سپس نوک پستان را به گونه‌ای و لب نوزاد تماس دهد تا او دهانش را باز کند و نوک و هاله



## تغذیه با شیر مادر



نهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار

۵- مکیدن ها کند ولی عمیق است (جاری شدن شیر در دهان صدای بلعیدن شیر بخوری شنیده یا بلد دیده می شود)

شیرخوار به راحتی قادر به شیر خوردن از پستان مادر خواهد بود

روش چهارم

۶- نوزاد پس از احساس رضایت و سیر شدن خودش پستان را رها می کند

(تغذیه دوقلوها) مجموعه‌ای از روش اول و دوم و سوم مطابق شکل می باشد از روش زیر بغلی زیر بغل و یک معمولی تغذیه همزمان در وضعیت روش موازی

روش صحیح شیردهی

۷- در هنگام شیر دادن احساس درد و ناراحتی نمی کند

چانه چسبیده به پستان

۱- بدن نوزاد رو برای مادر و در تماس نزدیک با بدن او قرار گرفتن هاله پستان در دهان لب تحتانی به بیرون برگشت است

۲- سر و بدنش در یک امتداد قرار دارد

۳- صورتش روی پستان مادر و چانه اش به پستان چسبیده است

۴- لب تحتانی او کاملا به طرف خارج برگشته و قسمت کمی از هاله پستان در طرف لب فوقانی او مشاهده می شود و در پایین کمتر دیده می شود