

سزارین چیست؟

سزارین عبارت است از یک برش برروی شکم، عضلات زیر آن و جدار شکم و خروج نوزاد از این طریق. سزارین ممکن است با استفاده از بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی انجام شود.

با توجه به صلاح‌دید پزشک در صورت استفاده از روش نخاعی شما می‌توانید بلاfacile بعداز تولد نوزاد خود را ببینید و با کمک پرستار اورا لمس کنید.

انواع سزارین کدامند؟

عمل سزارین به دو نوع اصلی براساس محل برش رحمی تقسیم می‌شود:

✓ برش عمودی از قدام تنہ رحم که به ندرت انجام می‌شود.

✓ برش عرضی قسمت تحتانی رحم که معمولاً از این روش استفاده می‌شود.

سزارین به چه دلایلی انجام می‌شود؟

▪ عدم تطابق سر جنین با لگن این امر در معاینه های داخلی و زمانی که پیشرفت زایمانی خوب نباشد میسر است.

*زجر جنینی:

در صورتیکه تغییرات بارز در ضربان قلب جنین ایجاد شود نشان دهنده این است که میزان اکسیژن خون کافی نیست و مواد زائد خون جنین بیشتر شده است.

*طرز قرار گرفتن غیر عادی جنین:

اگر جنین به صورت عرضی قرار گرفته باشد امکان زایمان طبیعی وجود ندارد.

*مشکلات مربوط به جفت و بند ناف:

اگر جفت زودتر از موقع جدا گردد و یا بجای اینکه در قسمت فوقانی رحم واقع گرددبرروی دها نه رحم قرار گیرد (جفت سر راهی).

*سزارین قبلی

اگر سر جنین به سمت لگن نچرخیده باشد.

*حاملگی بیش از دوقلو

*موارد متفرقه:

تبخال فعل ناحیه تناسلی، فشار خون بالا، دیابت، جنین درشت؛ ایدز، داشتن سابقه مرگ نوزاد و سن بیش از 35 سال مادر، خواست مادر؛ یا بیماریهای خاصی که مادر به آنها مبتلاست. (مثل بیماریهای قلبی)

*مراقبتهای پس از ترمیص:

✓ پس از عمل زمانیکه هوشیاری خود را کاملاً بدست آورده‌ید می‌توانید نوزاد خود را در آغوش گرفته و به او شیر دهید.

✓ روشهای شیر دهی به شما آموزش داده خواهد شد.

✓ سردرد، سرگیجه و تهوع جزء عوارض بعد از عمل می‌باشند، در صورت بروز آنها به پرستار اطلاع دهید.

✓ درد در ناحیه عمل جراحی طبیعی است. در صورت لزوم به شما مسکن داده می‌شود.

✓ هر گونه خونریزی از محل عمل یا واژن را به پرستار اطلاع دهید.

✓ 8-12 ساعت پس از عمل (بنا به صلاح‌دید پزشک) از تخت پایین آمده و راه بروید. این کار از جمع گاز در شکم کاسته و درد ناشی از آن را از بین می‌برد.

✓ جهت پیشگیری از یبوست زمانیکه به شما اجازه نوشیدن داده شد، مایعات فراوان استفاده کنید.

✓ بعد از خروج سوند در صورت عدم دفع ادرار یا ادرارخونی اطلاع دهید.

*مراقبتهای پس از ترمیص:



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

سزارین




FARS

FARS NEWS AGENCY

تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار

- ✓ از بلند کردن چیزهای سنگین تر از وزن نوزاد تا 2 هفته بپرهیزید.
- ✓ تا 6 هفته بعد از عمل با صلاحیت پزشک می توانید مقاربت جنسی را آغاز نمایید.
- ✓ استحمام بعداز ترجیح ممانعت ندارد.(با احتیاط)
- ✓ حداقل سه هفته بعداز زایمان جهت انتخاب روش پیشگیری از بارداری مراجعه نمایید.



- ✓ در صورتیکه برای شما بخیه غیر قابل جذب استفاده شده است روز دهم جهت کشیدن بخیه به درمانگاه زنان مراجعه نمایید.
- ✓ در صورت لزوم از اطرافیان کمک بگیرید، خجالت نکشید!
- ✓ در صورت درد می توانید طبق دستوراز مسکن استفاده کنید.
- ✓ میزان مصرف مایعات را بالا ببرید تا دچار بیوست نشوید.
- ✓ هر گونه قرمزی، گرما، ترشح و ورم در ناحیه برش را به پزشک اطلاع دهید.
- ✓ ترشحات واژن ممکن است تا 6 هفته ادامه یابد پس از آن قطع خواهد شد.
- ✓ استراحت در منزل لازم است با این حال بطور منظم از جا برخاسته و حرکت نمایید.
- ✓ راه رفتن پدیده بهبود را تسريع کرده و به پیشگیری از عوارضی نظیر لخته شدن خون کمک میکند.

- ✓ نباید فعالیت بیش از حد داشته باشید، از فعالیت آهسته شروع کرده و رفته رفته به آن بیافزایید