

تعریف سقط:

دفع محصولات حاملگی قبل از هفته ۲۰ بارداری راسقط گویند. به دفع محصولات حاملگی بعداز هفته ۲۰ بارداری زایمان نام دارد.

شایع ترین عارضه بارداری ها سقط می باشد که در ۱۵درصد حاملگی های تشخیص داده شده سقط رخ میدهد از آنجا که برخی بارداری ها بدون تشخیص منجر به سقط شده نمیتوان آمار دقیقی از کل بارداری ها بیان نمود.

نکته ۱: درصورتیکه در ساک حاملکی جنین یا رویان نباشد یا جذب شده باشد به این بارداری تخم پوچ یا ساک خالی گویند.

نکته ۲: درصورت عدم رویت قلب جنینی در زمان مورد انتظار در سونوگرافی به آن "جنین بدون قلب" اطلاق میشود.

علل سقط: علل جنینی - علل والدی - علل خارجی

علل جنینی:

اکثر (۶۰٪) سقطهای سه ماهه اول با علل کروموزومی رخ میدهد.

علل والدی:

سن مادر رابطه مستقیم با سقط دارد بطوریکه با افزایش سن مادر بعد لز ۳۵ سالگی سقط افزایش میابد و در سن بالای ۴۵ سال بیش از ۵۰ درصد حاملگی ها سقط میشوند که علت آن پیرشدن تخمک و مشکلات ژنتیکی است. البته سن زیر ۲۰ سال هم میزان سقط را ۱۲ درصد ذکر شده است.

سابقه سقط در بارداری قبلی احتمال سقط بارداریهای بعدی را افزایش می دهد.

همچنین مشکلات رحمی مادر از جمله میوم رحمی - رحم دوشاخ - رحم تک شاخ - رحم دیواردار - نارسایی دهانه رحم - اختلالات هورمونی مادر - مشکلات تخدمانی و مشکلات ایمنی مادر از جمله علل مادری سقط جنین میباشد.

علل خارجی:

صرف داروها - مواد شیمیایی - قهوه زیاد - الکل - سیگار

أنواع سقط:

تهدید به سقط - سقط اجتناب ناپذیر - سقط ناقص - سقط کامل - سقط فراموش شده - سقط عفونی و سقط مکرر

تهدید به سقط: هر نوع ترشح خونی یاخونریزی رحمی در نیمه اول بارداری که ممکن است چند روز طول بکشد و معمولاً بعداز این علامت کرامپ شکمی و کمردرد نیز همراه است و بافت و نسج جنینی دفع نشده و در معاینه واژینال دهانه رحم بسته است.

تشخیص با سونوگرافی واژینال میباشد که در سونوگرافی جنین طبیعی و حیات دارد.

درمان: استراحت - عدم نزدیکی

پیش آگهی: درصورت کاهش درد و خونریزی ادامه بارداری اتفاق میافتد و در صورت افزایش درد و خونریزی و کاهش سطح بتا HCG احتمال سقط افزایش میابد.

سقط اجتناب ناپذیر: درصورت خونریزی واژینال همراه با درد و پارگی کیسه آب و بازشندهانه رحم سقط از نوع اجتناب ناپذیر میباشد.

تشخیص: معاینه واژینال و سونوگرافی

درمان: تخلیه محتویات رحم از طریق کورتاژ یا درمان دارویی

سقط ناقص: محتویات بارداری بصورت ناقص از دهانه رحم دفع شده و قسمتی از بقایای جفت یا نسج جنینی داخل رحم باقیمانده است.

تشخیص: سونوگرافی

درمان سقط ناقص: مشابه سقط اجتناب ناپذیر

از جمله کوچک شدن سایز سینه ها و عدم رشد سایز رحم

سقط کامل: دفع کامل محتویات رحم (جفت و جنین و ساک حاملگی) که بدنبال دفع بسرعت خونریزی و درد کاهش میابد.

تشخیص: در معاینه واژینال دهانه رحم بسته و در سونوگرافی رحم خالی میباشد.

درمان خاصی نیاز ندارد و جهت اطمینان از خالی بودن رحم سونوگرافی کمک کننده است.

سقط فراموش شده: جنین مدت طولانی است که مرده است.

سقط عفونی: بدنبال دستکاری رحم در شرایط غیر استریل مادر دچار تب و درد شکم و درد رحم همچنین ترشحات قهوه ای بدبو میشود. بسیار خطناک است و برای مادر تهدید کننده حیات میباشد.

تشخیص: سونوگرافی به همراه ارزیابی آزمایشگاهی و چک علایم حیاتی
درمان: بستری و دریافت آنتی بیوتیک و کورتاژ

سقط مکرر: اگر خانمی ۳ یا بیشتر از ۳ بار متوالی در سه ماهه اول بارداری سقط داشته باشد سقط از نوع مکرر می باشد. برای ۵۰ درصد این نوع سقط علتی یافت نشده است.
تشخیص: بررسی آزمایشگاهی - ارزیابی ساختاری رحم (سونوگرافی و عکس رنگی)

آموزش و توصیه های لازم به مادران به دنبال سقط:
مادر باردار به هر علتی در بارداری دچار لکه بینی یا خونریزی شود باید از نظر گروه خون ارزیابی شود تا درصورت منفی بودن گروه خون مادر و مشبت بودن گروه خون همسر آمپول روگام تزریق شود زیرا تداخل خونی طی برداری موجب مشکلات خونی جنین در بارداری های بعدی مادر میشود این مورد (ارزیابی و تعیین گروه خون) برای سقط نیز باید بررسی شود.

علایم خطر بدنبال سقط:

خونریزی بعداز سقط یا کورتاژ همانند پریود میباشد که درصورت دفع لخته - خونریزی بیش از پریود - ادامه خونریزی بیش از ده روز - ترشحات بد بو و عفونی - درد شکم ولگن - سرگیجه و تاری دید. درصورت بروز هر گونه علام خطر میباشد که نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
بیمه اسلام حضرت رسول (ص) جوانروز

سقط


و خودمراقبتی در آن

تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار



۱۵



بارداری بدنبال سقط:

بعد از اتمام روند بستری و سقط جنین مادر میباشد تحت نظر متخصص زنان باشد تا در صورت صلاحید برسی های بیشتر جهت مشخص شدن علت سقط انجام شود و با مشورت ایشان زمان مناسب برای بارداری مجدد تعیین شود به نحوی که از سقط بعدی پیشگیری شود. تازمان اجازه پزشک برای بارداری مجدد بیمار باید روش جلوگیری مطمئن داشته باشد تا از بارداری پرخطر و سقط مجدد حتی امکان جلوگیری شود.

ارزیابی جنین یا بقایای بارداری بعد از سقط:

جهت برسی علت سقط مادر میتواند جنین یا بقایای بارداری دفع شده را داخل محلول نرمان سالین (موجود در بخش) گذاشته و به آزمایشگاه جهت ارزیابی ژنتیک ارسال کند همچنین ارسال نمونه به پاتولوژی میتواند تعیین کننده این باشد که آنچه دفع شده جنین بوده است یا جفت اما از نظر ژنتیک باید در آزمایشگاه ژنتیک برسی کامل شود.

دارودارمانی بعد از سقط:

بعد از سقط مادرقرص آهن- آنتی بیوتیک و قرص کنترل کننده خود را، د حسب صلاحید بنشک معالج تحقیق مر. ۵۵.