

داروها می تواند تا چند هفته بعد از جراحی هم ادامه پیدا کند.

#### پانسمان:

معمولًا پانسمان زخم جراحی تا ۴۸ ساعت بعد از عمل جراحی تعویض نمی شود. تعویض پانسمان باید بعد از مرخص شدن بیمار در منزل انجام شود در صورتی که بیمار ماندگار در بیمارستان شود تعویض پانسمان توسط پرستاران بخش انجام می شود.

#### راه رفتن:

بعد از جراحی توسط یک فیزیوتراپ آموزش داده می شود که چطور می توانید در تخت بنشینید و چطور می توانید از عصای زیر بغل یا واکر استفاده کنید.

#### مراقبت از گج:

باید در چند روز اول بعد از گج گیری دراز کشیده و یک یا چند بالش زیر اندام طوری قرار داد که ساق بالاتر از سطح قلب قرار بگیرد. انجشتان پای شکسته شده را مکررا حرکت دهید. مقداری بخ خرد شده را در یک کیسه پلاستیکی خشک قرار داده و آن را روی گج یا آتل در محل شکستگی قرار دهید.

**نکات قابل توجه:** ممکن است پزشک معالج داروهای آنتی بیوتیک خوراکی برای شما تجویز کند تا بعد از مرخص شدن از بیمارستان تا مدتی از آنها در منزل استفاده کنید. از قطع کردن آن بدون دستور پزشک خودداری کنید.

تواند بدون عصا راه برود. با این حال دویدن و انجام فعالیت های ورزشی باید با دستور پزشک باشد.

#### ۲- روشی غیر جراحی:

در مواردی که شکستگی بدون جابجاگی است باید از جابجا شدن شکستگی تا وقتی قطعات به هم جوش می خورند جلوگیری کرد. در این موارد درمان به صورت گج گیری می باشد. کف پا و ساق بیمار تا مفصل زانو گج گیری می شود به نحوی که بیمار بتواند زانوی خود را خم کند.

**مدت نگهداری گج:** بر حسب شکستگی، گج پای بیمار پس از ۶ هفته تا ۱۲ هفته خارج شده و نرمش های خاصی جهت بدست آوردن دامنه حرکت مج پا و عضلات ساق انجام می شود. یکی از مشکلات این نوع درمان این است که وقتی مج پا بیمار به مدت سه ماه در گج می ماند پس از خروج از گج دچار محدودیت حرکتی می گردد که ممکن است با فیزیوتراپی و انجام نرمش های لازم به بطور کامل بهبود نیابد.

#### لخته شدن خون در رگ:

یکی از عوارض شکستگی لخته شدن خون در سیاه رگ های عمیق ساق است. که می تواند بسیار خطرناک باشد لخته شدن ممکن است موجب اختلال در عملکرد قلب و ریه شود. بعد از جراحی داروهایی داده می شود تا از لخته شدن خون در پاهای جلوگیری شود که به آن داروهای رقیق کننده خون می گویند. استفاده از این

شایع ترین دلایل شکستگی در استخوان ساق پا زمین خوردن(سقوط)، تصادفات با وسایل نقلیه و آسیب های ورزشی میباشد.

#### علائم شکستگی:

- ✓ مهمترین علامت این شکستگی درد و تورم و تغییر شکل در ناحیه ساق می باشد. درد با حرکت و فشار به محل شکستگی بیشتر میشود.
- ✓ تورم و حساسیت به لمس
- ✓ کبودی و تغییر شکل آشکار
- ✓ ناتوانی در راه رفتن



#### روشهای درمانی:

#### ۱- درمان جراحی:

معمولًا با گذاشتن پلاتین در پا می باشد. پلاتین ممکن است داخلی یا خارجی باشد.

بعد از جراحی معمولا در عرض سه ماه استخوان به اندازه ای جوش می خورد که فرد بتواند بدون کمک و بدون استفاده از عصا راه برود اما تمام بیماران قبل از راه رفتن باید توسط پزشک معاينه و از ساق آنها عکس رادیولوژی گرفته شود. در صورتی که عکس رادیولوژی نشان دهنده جوش خودگی شکستگی باشد فرد می



## شکستگی استخوان ساق پا



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار



❖ با تغییر وضعیت و آرامش فکری و پرت کردن حواس به کاهش درد کمک کنید.

❖ در صورت تورم و درد غیر قابل کنترل ، سردی و رنگ پریدگی انگشتان و فلچ ، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

❖ در صورت داشتن علائم عفونت از جمله تب ، لرز ، قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید.

❖ از روز سوم به بعد میتوانید حمام بروید.بخیه هارا تمیز و خشک نگه دارید. تعویض پانسمان باید بعد از مرخص شدن در منزل توسط پرستار یا همراه بیمار که در بیمارستان آموزش دیده انجام شود.

❖ بخیه های ناحیه عمل شده دو هفته پس از عمل طبق نظر پزشک کشیده میشود.

❖ تنفس عمیق و سرفه به خروج خلط از ریه کمک میکند.

❖ بیوست از عوارض بعد از عمل می باشد که به دلیل کاهش حرکت و استفاده از داروهای ضد درد می باشد . آب کافی ، حرکت سریعتر - مصرف مواد غذایی حاوی فیبر از جمله سبزیجات - غلات - میوه های تازه می تواند برای جلوگیری از بیوست مصرف شود.

### کنترل درد:

❖ درد مدت کوتاهی پس از جراحی به سرعت کاهش می یابد. بعد از ۲ الی ۳ روز اغلب فقط گاهی برای رفع سفتی و گرفتگی عضلات به داروهای مسكن طبق دستور پزشک نیاز پیدا می کنید.

❖ استفاده از کیسه یخ می توان به کنترل درد و تورم کمک کنید.