


حاملگی را خارج مینمایند و اگر علت خونریزی نامعلوم است از بافت رحم نمونه (بیوپسی) بر میدارند.



اگر پزشک شما ناحیه‌ی مشکوکی را یافت، او ممکن است یک بخش یا همه‌ی آن را خارج کند و به آزمایشگاه بفرستد. یک آسیبشناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش میکند، تا سرطان یا دیگر بیماریهای احتمالی را تشخیص دهد.



## مراقبتهای بعد از عمل:

### قبل از موارد زیر حتماً با پزشک خود مشورت

#### کنید:


1. انجام کارهای سنگین بعد از عمل جراحی.
2. داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی.

## موارد خونریزی غیر طبیعی وازن

1. بعد از تماس جنسی.
2. هنگام یائسگی یا بعد از آن.
3. در بین دو دوره‌ی قاعده‌گی به صورت لکه بینی.
4. ترشح خونی از وازن یا خونریزی در نیمه‌ی اول حاملگی.



عمل دیلاتاسیون و کورتاژ ضمن بیهوشی عمومی یا بیحسی ناحیه‌ای، بعد از اینکه شما در وضعیت مناسبی قرار دادند که دسترسی به رحم آسان باشد، انجام میشود.



ابتدا دهانه‌ی رحم را متسع (باز) میکنند؛ در صورتیکه علت خونریزی سقط است، محصولات


## دیلاتاسیون و کورتاژ؟

باز کردن دهانه‌ی رحم و تخلیه‌ی نسج آن را گویند. این عمل یکی از شایعترین عملهای زنان است،

میتواند برای تشخیص یا درمان خونریزیهای غیرطبیعی زنان به کار رود.


## خونریزی غیر طبیعی از وازن چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیرطبیعی از وازن گردد. خونریزی غیرطبیعی به خونریزی گفته میشود که در زمانی خارج از انتظار ما اتفاق بیافتد.





# دیلاتاسیون و کورتاژ



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار



در صور تیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا 6 ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیمگیری برای بارداری مجدد حتماً تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود. ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

بعد از کورتاژ لازم است، قرصهای آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت 3 ماه برای جبران کم خونی خود استفاده نمایید.

**در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه نمایید:**

1. تب
2. ترشحات زیاد و غیرطبیعی
3. درد زیاد در قسمت زیر شکم
4. افزایش خونریزی
5. ترشحات بدبو
6. هر نوع حالت غیرطبیعی مثل سردی، ضعف، بیحالی، تب وغیره.

\*توجه داشته باشید عمل دیلاتاسیون و کورتاژ هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می توانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.