

## کاتتر یا شالدون چیست؟

کاتتر شالدون **دیالیز** یک لوله‌ی نرم و انعطاف‌پذیر است که از طریق گردن یا شانه‌ی بیماران وارد سیاهه‌گ مرکزی گردن می‌شود. این لوله می‌تواند به دو صورت موقعیتی و یا دائمی در داخل رگ‌های بیمار قرار بگیرد. کاتتر شالدون **دیالیز** دارای دو لوله است که یکی از آن‌ها برای خروج خون از بدن بیمار کاربرد دارد. سیس خون را وارد دستگاه دیالیز می‌کند تا تصفیه شود. بعد از تصفیه شدن، خون مجدد به داخل بدن بیمار برمی‌گردد.



### أنواع کاتتر شالدون و کاربرد آن ها

کاتتر شالدون شامل دونوع موقت و دائمی است. نوع موقت فقط برای مدت حداقل یک ماه قابل استفاده است. در حالی که از نوع دائم برای مدت حداقل یک تا دو سال استفاده می‌شود. کارکرد هر دونوع کاتتر به یک شکل است. تنها تفاوت آن‌ها در نحوه نصب بر روی بدن بیمار است.

کاتتر شالدون موقت در موارد ضروری و اورژانسی کاربرد دارد. این نوع کاتتر در داخل گردن، کتف و یا کشاله ران قرار می‌گیرد. نوع دائم از طریق یک تولل زیربوقتی در قسمت سینه (ورید ژوگلار) قرار می‌گیرد.


کاتتر شالدون موقت با کمک پخیه به بدن بیمار نصب می‌شود. در صورتی که کاتتر شالدون دائمی با روش جراحی در داخل سیاهه‌گ قرار می‌گیرد و به مدت طولانی تری استفاده می‌شود. پزشک برای اینکه **کاتتر شالدون دیالیز** محکم در جای خود قرار بگیرد، با کمک نوعی روکش و چند پخیه، آن را در زیر بوقت ثابت می‌کند.

## آمادگی قبل از عمل :

- ۱- قبل از جایگذاری دوش بگیرید و موهای محل مورد نظر را بتراشید.
- ۲- در صورت مصرف داروهای فشار خون یا واقعی کننده خون پزشک خود را در جریان قرار دهید.
- ۳- نیاز به ناشتا بودن ندارد.
- ۴- اغلب نیاز به ستری در بیمارستان ندارد
- ۵- نیازی به خوردن آنتی بیوتیک یا مسکن خاصی قبل و یا بعد از شالدون کذاری نیست
- ۶- شالدون کار گذاشته شده در کشاله ران تا حدود یک هفته و شالدون موجود در گردن تا حدود ۱۱ روز الی ۲ ماه و شالدون دائم تا ۱۱۲ ال ۲۴ ماه قابل استفاده است .
- ۷- قطع مصرف آسپرین ۳ روز قبل و پلاویکس ۵ روز قبل و وارفارین با نظر پزشک باید صورت گیرد.

- ۸- بعد از ضد عفنونی کردن بوقت ، محل ورود کاتتر شالدون بیحس می شود. سپس بعد از کار گذاری با پخیه در محل ثابت می‌شود.
- ۹- بعد از انجام کار از شما عکس قفسه سینه گرفته می شود.





## خود مراقبتی در کاتتر شالدون

تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار

### عوارض کاتتر گذاری

سوzen نخوردن با هر بار دیالیز از محاسن کاتتر می باشد.اما از مهمترین خطرات در کوتاه مدت ایجاد لخته و عفونت است.و جهت پیشگیری از لخته پرستار پایان دیالیز الین ها را با محلول هپارین شستشو می دهد.و محل کاتتر به ویژه کاتتر دائم پانسمان استریل می کند.

عوارض کاتتر گذاری بسیار نادر است، این عوارض شامل خونریزی آسیب به بافت های مجاور از جمله شریان و به ندرت آسیب ریه می باشد. عوارض دیر رس کاتتر شامل عفونت، ایجاد لخته در رگ و تنگی کاتتر می باشد.

**آیا باید در مورد کاتتر نکرانی داشته باشید؟**

گاهی اوقات، حتی زمانی که بسیار مراقب هستید، ممکن است محل دسترسی لخته یا عفونی شود.

لخته می تواند در داخل دهانه کاتتر یا در قسمت بیرونی کاتتر ایجاد شود و دهانه را مسدود کند. این مشکل می تواند باعث شود خون با سرعت کمتری نسبت به سرععتی که مورد نیاز است جریان یابد. اگر سرعت جریان خون برای بیش از یک درمان دیالیز پایین بماند، کاتتر باید در همان روز بررسی و اصلاح شود. درمان زودهنگام ممکن است از مسدود شدن کامل لخته در کاتتر جلوگیری کند. بازگرداندن میزان توصیه شده جریان خون و درمان لخته های تشکیل شده بسیار مهم است تا کاتتر شما به خوبی به کار خود ادامه دهد و میزان دیالیز مورد نیاز را دریافت کنید.

عفونت حتی با سرعت جریان خون خوب نیز ممکن است رخ دهد. پیروی از دستورالعمل های مراقبت از کاتتر، دقیقاً همانطور که به شما آموزش داده شده است، مهم است تا از عفونت جلوگیری شود. شما باید علائم و نشانه های عفونت کاتتر را بدانید و فوراً به پزشک یا تیم دیالیز خود گزارش دهید تا بتوانید در اسرع وقت درمان مناسب را دریافت کنید.

