

هپاتیت C

یک عفونت ویروسی است که باعث التهاب کبد می شود . دوره ای نهفتگی آن ۱۵ روز می باشد از آنجاییکه این نوع هپاتیت نه هپاتیت آ است و نه هپاتیت B به همین دلیل ، به آن هپاتیت nonB NonA یا هپاتیت سی می گویند.

علائم:

این بیماری ممکن است بدون علامت باشد ، درموارد حاد بیماری علائم شامل : بی اشتهايی ، خستگی مفرط، تهوع، استفراغ ، دردشکم (سمت راست زبردنده ها) ، تیره شدن ادرار، کم رنگ شدن مدفعه ،زردی پوست، تب و درد مفاصل است.

افراد در معرض خطر:

- معتادین به مواد مخدر تزریقی.
- دریافت کنندگان خودن و فرآورده های خونی شامل : افراد مبتلا به تالاسمی و هموفیلی.
- افراد دیالیزی
- کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی و کارکنان آزمایشگاه.
- نوزادان متولد شده از مادران عفونی با این ویروس
- داشتن رابطه ای جنسی با شریک یا شرکای جنسی آلوده

راه های انتقال:

- درین معتادین به مواد مخدر تزریقی ، به دلیل استفاده از سرنگ مشترک و غیر مشترک
- انتقال از طریق خالکوبی ، تتو، حجامت و سرواخ کردن گوش.
- انتقال خون آلوده یا تماس خون آلوده با پوست زخمی یا مخاط ،(مثل چشم و دهان)
- انتقال از مادر به جنین

پیشگیری:

يشگيري در اين نوع هپاتيت رعایت بهداشت فردی می باشد:

کارکنان مراکز بهداشتی در موقع لازم از وسایل حفاظتی مانند: دستکش ، گان و عینک استفاده کنند و خود را در برابر هپاتیت B واکسینه نمایند.

به معتادین تزریقی توصیه می شود حتما در هر بار تزریق از وسایل تزریقی نو و استریل استفاده کنند.

از مصرف مشترک وسایلی مانند ریش تراش ، تیغ، مسوک ، ناخن گیر و موچین بپرهیزید.

از بی بند و باری جنسی پرهیز و در صورت تماس جنسی نامطمئن ، از کاندوم استفاده شود.

در حد امکان از خالکوبی ، تتو و حجامت خودداری کنید.

نکات استریل را در موقع سوراخ کردن گوش رعایت نمایید و جهت سوراخ کردن آن به مراکز بهداشتی مطمئن مراجعه کنید.

درمان:

استراحة: در طی روز دوره های متناوب استراحت داشته باشید . و از فعالیتهای شدید و پر استرس خودداری کنید.

رژیم غذایی: در موارد حاد بیماری ، غذای پرکربوهیدرات و کم پروتئین و سپس مواد غذایی مقوی مثل : گوشت ، مرغ ، ماهی ، تخم مرغ ، لبنیات ، حبوبات ، غلات ، انواع میوه ها ، سبزیجات تازه ، آجیل و مغز دانه ها را مصرف کنید.

▣ توصیه می شود از مصرف الكل ، غذاهای سرخ کردنی ، لبنیات پر چرب، غذاهای آماده ،کالباس ، سوسیس،شکلات و کیک خودداری کنید.

طبق توصیه ی پزشک ، مایعات فروان مصرف کنید.

در صورت داشتن تهوع و استفراغ غذا را در حجم کم و به دفعات بیشتر مصرف کنید.

توصیه در هنگام مصرف دارو: از مصرف داروهایی با دفع کبدی مانند : استامینوفن بدون تجویز پزشک خودداری کنید.

پیشگیری درمان:

● در صورت شروع درمان جهت انجام معاینات دوره ای و آزمایش، طبق زمانبندی تعیین شده به پزشک خود مراجعه کنید.

● در صورت بروز علائم تهوع مداوم، استفراغ ، زردی ، تغییر در سطح هوشیاری ، کبودی غیرطبیعی ، خونریزی طولانی مدت ، تورم شکمی ، افزایش وزن و خونریزی از محل های غیر طبیعی (شامل خون در ادرار، مدفوع سیاه رنگ و خونریزی از زخم) به پزشک خود اطلاع دهید.

مراقبت های لازم جهت پیشگیری از انتقال ویروس به دیگران:

● در صورت آغشته شدن لباسها و ملحفه ها به خون و ترشحات بدن ، آنرا جداگانه با آب داغ بشویید.

● هرگز خون اهدا نکنید.

● از بی بند و باری جنسی بپرهیزید.

● تا حد امکان از تزیقات زیر جلدی و عضلانی پرهیز نمایید.

● زنان شیرده ی مبتلا، باید نوک سینه ها را قبل از هر باز شیردهی بررسی کنند ، در صورت ترک و خونریزی در نوک سینه ها ، شیردهی به طور موقت قطع شده و همه شیر دوشیده و دور ریخته شود.

● معتقدان تزریقی مبتلا حتماً از سوزن و سرنگ استریل و وسایل شخصی خود مانند : ریش تراش ، موچین ، مسواک و تیغ جداگانه استفاده کنند.

● بریدگی ها و زخمها را با پاسمان مناسب بپوشانید..

● جهت رعایت احتیاطات لازم در صورت مراجعه به مراکز پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاه، پرسنل را از وضعیت خود آگاه سازید.

توجه : هپاتیت سی واکسن ندارد