

تشخیص

تشخیص حاملگی خارج رحمی توسط پزشک براساس علائم بالینی ، اندازه گیری هورمون **BHCG** و سونوگرافی صورت می گیرد .

درمان

درصورتی که احتمال قوی به حاملگی خارج رحمی داده شود ، با توجه به شرایط بیمار و پیشرفت حاملگی ، جراحی انجام می شود .

* درمان طبی در موارد خاص ، با دارو و کنترل دقیق علائم بالینی و حیاتی ، در بیمارستان قابل انجام است .



شکل ۳: درصورت تشخیص حاملگی خارج رحمی در بیمار عمل جراحی انجام می شود .

عالئمی که در صورت ایجاد باید به پزشک مراجعه کرد

raig ترین شکایت حاملگی خارج رحمی درد شکمی است شدت درد متغیر است و ممکن است یک طرفه یا دوطرفه ، در قسمت تحتانی شکم احساس شود .




شکل ۲: دردشکم کهraig ترین شکایت پس از بروز حاملگی خارج رحمی است .

در حاملگی لوله ای به جای آن که جنین در رحم جای بگیرد ، در لوله های رحمی گیر افتاده و در آنجا رشد می کند . به این دلیل که لوله های رحمی گنجایش بزرگ شدن جنین را ندارند ، در یک زمان نامعلوم لوله های رحمی بدليل فشار پاره می شود و نوعی خونریزی غیرقابل کنترل در شکم رخ می دهد . اگر ظرف چند ساعت بیمار به اورژانس مراجعه نکند احتمال مرگ وی به دلیل خونریزی داخلی وجود دارد .

حاملگی خارج رحمی چیست؟

حاملگی خارج رحمی وضعیتی اورژانسی است که به بمب ساعتی معروف است و تقریباً در یک یا دو درصد بارداری ها اتفاق می افتد . شایع ترین مکان که حاملگی خارج رحمی رخ می دهد لوله های رحمی هستند که از تخمدان به رحم کشیده شده اند . حاملگی خارج رحمی ممکن است در مکان های مختلفی مانند تخمدان ، گردن رحم یا کاملا خارج از دستگاه تناسلی فرد و خارج از حفره رحم اتفاق بیافتد و به همین دلیل به حاملگی خارج رحمی ، حاملگی لوله ای نیز گفته می شود .




شکل ۱: نمایی از حاملگی خارج رحمی که بیشتر در لوله های رحمی اتفاق افتاده است .



حاملگی خارج رحمی

Ectopic Pregnancy



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار

۶- انجام کارهای شخصی و سبک در منزل مانع ندارد.

۷- سه روز بعد از عمل می توانید بصورت روزانه استحمام نمائید (البته با تأیید پزشک). ولی در هر صورت رعایت بهداشت فردی الزامی می باشد.

۸- از خوردن غذاهای نفخ همچون حبوبات ، شیر ، میوه های خام ، آبمیوه های صناعی خودداری کنید و سعی کنید غذاهای سبک در حجم کم و غنی از پروتئین مصرف کنید. مصرف آب به میزان فراوان بسیار مفید است.

۹- حدود ۱۰-۱۴ روز بعد از عمل، با در دست داشتن برگه خلاصه پرونده و پس از دریافت جواب پاتولوژی از آزمایشگاه ، جهت ویزیت مجدد و کشیدن بخیه ها به پزشک معالج مراجعه فرمائید.

۱۰- بعد از عمل در صورت مشاهده هر کدام از علائم زیر حتماً به پزشک خود و در صورت عدم دسترسی به اورژانس زنان مراجعه نمائید: تب، دردشدید شکم ، عدم دفع گاز، تهوع و استفراغ طول کشنه، خونریزی واژینال، ترشحات بد بو از محل زخم یا واژن و ...

۱۱- مادران با گروه خونی منفی با همسران گروه خونی مثبت باید آمپول رگام دریافت کنند .

مراقبت های پس از عمل و حین ترجیح laparatomی یا laparskoپی EP

۱- پس از عمل، مدت زمان بستره در بخش با توجه به وضعیت بیمار و نظر پزشک می باشد.

۲- بهتر است حداقل ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از عمل، با نظر پزشک معالج (به همراه پرستار برای اولین بار) از تخت پایین آمده و راه بروید. راه رفتن را به طور مرتب انجام دهید.

۳- بهتر است حداقل هر ۲ ساعت یکبار نفس عمیق بکشید و سرفه کنید. این حرکت تا حدود زیادی از عفونت ریه ها جلوگیری می کند. برای پیشگیری از هرگونه ناراحتی درهنگام سرفه، می توانید محل عمل را با بالش نگه دارید.

۴- مراقبت از محل زخم : محل زخم چه در روش باز (laparatomی) و چه در روش بسته (laparoskoپی) باید خشک نگه داشته شود. تعویض پانسمان محل زخم با دستور پزشک انجام گیرد.

۵- پس از ترجیح کلیه داروهای تجویز شده جهت منزل ، از قبیل: آنتی بیوتیک ، مسکن و غیره را طبق دستور پزشک و بطور صحیح (میزان، فواصل زمانی ، تعداد کافی) مصرف نمایید.