

پنومونی

التهاب بافت ریه که یک یا دو طرف ریه را درگیر می کند پنومونی نامیده می شود و معمولاً بر اثر عفونت ایجاد می شود. عفونت ریه ممکن است در اثر میکرووارگانیسم های مختلفی شامل ویروس، باکتری، قارچ، استنشاق مواد شیمیایی مانند بخار های سمی یا مواد حساسیت زا ایجاد می شود.

عفونت ریه بیماری شایعی است و این بیماری به خصوص در افراد مسن و کودکان کم سن خطرناک است. در اثر آسپیراسیون یا استفراغ بخشی از محتویات معده، جسم خارجی وارد ریه ها شده و باعث التهاب ریه ها می شود.

نقص آناتومیکی (لب شکری)، بیماری های مادرزادی قلب، ریفلاکس، کم خونی، واکنش های ناشی از دارو و پرتو درمانی موجب التهاب ریه می شود.

علایم ممکن است به صورت ضعیف یا شدید تظاهر کند. در 30 درصد بیماران مبتلا به پنومونی ویروسی احتمال رشد عوامل بیماریزای باکتریایی نیز وجود دارد.

روندهای بیوبودی در نوع ویروسی مناسب است. معمولاً چند روز پس از یک عفونت دستگاه تنفسی فوکائی علایم به صورت سرفه، بی حالی، تب خفیف، سرفه های خلط دار و افزایش تعداد تنفس و ناله کردن ظاهر می شود.

درمان

- به صورت تسکین علامت و برطرف کردن عامل عفونت می باشد.
- اکسیژن مرتبط، فیزیوتراپی قفسه سینه، مصرف مایعات، کنترل تب
- در بیماران مبتلا به پنومونی باکتریایی آنتی بیوتیک توسط پزشک تجویز می شود.



توصیه ها


- در صورت بروز موارد زیر حتماً با پزشک خود مشورت کنید:
- ✓ افزایش تعداد تنفس و عمق آن و وجود صدای تنفسی به صورت خرخر و خس خس و یا صدای خشن و پرش پره های بینی
 - ✓ رنگ پریدگی، کبود شدن لب ها و ناخن ها و مخاط دهان
 - ✓ تنگی نفس، بی قراری و تحرک پذیری





پنومونی

گروه هدف: والدین



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار



آموزش حین قرخیص

- آموزش معیارهای ایمنی به بیمارانی که در منزل از اکسیژن استفاده می کنند. پرهیز از قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران
- تزریق واکسن پنوموکوک به مبتلایان به عفونت حاد ریوی ممنوع می باشد.
- آموزش شستن مکرر دست ها
- استفاده از دستمال و ماسک برای کنترل عفونت.



منبع: درسنامه پرستاری کودکان

✓ به علت استعداد ابتلای این کودکان به بیماری از بردن آنها به اماکن عمومی و تماس با افراد مبتلا به عفونت تنفسی اجتناب کنید.

✓ آنتی بیوتیک تجویز شده توسط پزشک را به میزان تجویز شده مصرف کنید حتی اگر عالیم کودکتان برطرف شده باشد.

