

آیا آب دستگاه دیالیز باعث عفونت می شود؟

بیمار دیالیزی در هر وعده در مجاورت ۱۲۰ تا ۲۰۰ لیتر از محلول دیالیز قرار می گیرد، قسمتی از این محلول از قبل تهیه شده و مابقی آن با آب شهری که در مراحل مختلف طی یک سیستم پالایش و خالص سازی از نظر میکروبیولوژی و مواد شیمیایی تصفیه می شود، در مراحل تصفیه محلول دیالیز ۹۵٪ مواد یونی و غیر یونی برداشته می شوند و شاید نتوان به صورت ۱۰۰٪ آب خالص و استریل تهیه کرد.

نکات:

-بعد از عمل جراحی فیستول موضع را مرتب و تمیز نگه دارد ، در صورت لزوم با محلول آب اکسیژنه یا بتادین شسته و پانسمان شود(در مرکز دیالیز و زیر نظر پزشک).

-جهت پیشگیری از عفونت تا چند ساعت پس از انجام دیالیز شستشو ممنوع می باشد. علائم عفونت مثل: قرمزی موضعی ، حساسیت در لمس تورم چرکی درد به دکتر گزارش شود. میتوان از کمپرس آب گرم به منظور کاهش درد استفاده نمود . همچنین استفاده صحیح از فیستول هنگام رگ گیری از تزریق مکرر سوزن به یک نقطه فیستول جلوگیری می کند.

آیا ممکن است به خاطر دیالیز دچار عفونت شویم؟

در بیشتر موارد ، با به کارگیری روش های صحیح ضد عفونی کردن، شامل: تمیز کردن پوست ، استفاده کردن از مواد ضد عفونی کننده ، در نقاط ورود سوزن یا هر کجا که خون به خارج از بدن جریان می یابد، می توان خطر عفونت را کاهش داد. علائم بروز عفونت شامل: ترشح و قرمزی شدید در محل کاتتر و بروز تب و لرز خصوصاً هنگام دیالیز می باشد. در صورت بروز چنین علائمی مراجعه سریع به پزشک و خارج کردن کاتتر زیر نظر پزشک مسئول توصیه می شود.

آیا خطر ابتلا به هپاتیت (برقان) زیاد است؟

هپاتیت (برقان) یک عفونت ویروسی کبدی است که در صورت مزمن شدن می تواند آسیب های جدی به کبد وارد نماید. هپاتیت نوع آ و ب شایع ترین هپاتیت در مراکز دیالیز است، که نوع ب از طریق انتقال خون و فرآورده های خونی یا آلدگی دستگاهها و تماس با سوزن آلدده از فردی به فرد دیگر ساخته می کند، نوع آ از طریق دست و آب و غذای آلدده منتقل می شود که با آزمایش می توان مشخص کرد که چه کسی مبتلا به هپاتیت خونی است، در مراکز دیالیز، باهی کارگیری روش های ایمنی و جداسازی دستگاههای همودیالیز بیماران منبت، مانع شیوع این بیماری می شوند. در هر صورت زدن واکسن هپاتیت جلوگیری از انتشار هپاتیت خونی نقش بسیار مؤثری دارد. لازم به ذکر است که امروزه به دلیل وجود روش های درمانی مناسب، کم خونی در افراد دیالیزی بسیار کمتر شده و دیگر چندان نیازی به تزریق و دریافت مکرر خون ندارند، این موضوع، بکی از دلایل اصلی کاهش خطر ابتلا به هپاتیت در افراد دیالیزی است.

مقدمه: بیماران دیالیزی دچار ضعف سیستم ایمنی بوده و خطر اکتساب بیماری های عفونی در آنها بیشتر از افراد سالم می باشد. لذا کنترل عفونت در این بیماران و تشخیص علایم اولیه عفونت اهمیت بالاتری دارد .

اقدامات زیر به کنترل عفونت کمک خواهد کرد :

شستن دست ها

استفاده از دستکش

کار گذاری کنترل یا شستن به روش صحیح



علایم عفونت:

شروع لرز قابل رویت با تب (تب مساوی یا بیشتر از ۳۷/۸) یا هر دو علامت در بیماری که قبل از نداشته و قبل از دیالیز نیز علائمی از عفونت نداشته است حائز اهمیت است .



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

پیشگیری از عفونت در دیالیز



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار

به هر حال ریسک عفونت در دیالیز وجود دارد ولی با مراقبت از دستگاهها و چکاب دستگاههای دیالیز و سیستم تصفیه در مدت زمان های تعیین شده و سنجش آن با استانداردهای جهانی می توان از انتقال بیماری ها ممانعت کرد.
ضعیف بودن سیستم ایمنی بیماران دیالیزی، تجمع سوموم در بدن، ابتلاء به سایر بیماریها از جمله دیابت و بد خیمی ها را از عوامل تشید کننده نقص ایمنی دانست که سبب مستعد شدن این بیماران برای ابتلاء به عفونت ها می شوند.
که با رعایت نکات پیشگیری و تغذیه مناسب (پروتئین مرغوب)

یعنی پروتئین هایی که ترکیب اسیدهای آمینه آن مطابقت بیشتری با نیازهای بدن دارد مانند: پروتئین سفیده تخم مرغ و شیر. می توان به پیشگیری از عفونت کمک کنند.

از دیگر منابع پروتئین: گوشت قرمز بدون چربی و تازه گوشت مرغ (وجه) و سایر پرندگان- ماهی و سایر غذاهای دریایی می باشد.



-قبل از تزریق، محل را دورانی با بتادین یا آب اکسیژنه شستشو دهید.

-بررسی درجه حرارت بدن، لرز، تعداد نبض، اشتها، ضعف و خستگی، خواب آسودگی، سرفه های خلط دار؛ ادرار کدر با بوی بد دارای اهمیت است.

-وجود قرمزی، التهاب و ترشح در محل ورود کاتتر دیالیز صفاقی و محل عروق دیالیز خونی چک شود

-چک مرتب آزمایش خون و آزمایش هپاتیت و تیتر آنتی بادی (که به طور مرتب در بخش برای بیماران دیالیز طبق تجویز پزشک معالج انجام میشود)

-روش شستن درست دستها را رعایت کنید

-خود را از افرادی که مبتلا به عفونت هستند محافظت کنید و در جمع و جاهایی که خیلی شلوغ است نروید از افراد سرماخورد دوري کنید.

-با توجه به اینکه عمل دیالیز با خون فرد در ارتباط است، انتقال باکتریهای روده ای از طریق خون به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و بیماریهای روده ای معمولاً از طریق دهان انتقال پیدا می کنند.

که رعایت بهداشت دهان و دندان بسیار حائز اهمیت می باشد.